MUTACIÓN MOGNO

Características

Los canarios MOGNO(*) están caracterizados por una modificación de las melaninas negra y bruna y por una reducción de la feomelanina. Hay una inversión de las eumelaninas negra y bruna con concentración bajo el canal medular de las plumas. De hecho la parte inferior del canal medular es más oscuro que las parte superior.

(*) Caoba

Negro Mogno

El factor MOGNO en estos pájaros reduce la feomelanina y realiza la inversión de la eumelanina negra, pero ninguna acción sobre el color del pico, patas y uñas que deben estar fuertemente oxidadas.

Las características descritas arriba proporcionan a estos pájaros un color general y un dibujo color plomo ("ébano").

Otra característica de esta mutación es el color negro en la parte inferior del canal medular de las remeras y timoneras.

Considerando que se trata de negros, una vez identificada la presencia de la mutación, debemos dar preferencia a los pájaros que mejor expresen sus condiciones de negros.

El dibujo debe ser lo más ancho y continuo posible, siempre de color plomo muy obscuro ("ébano"). Los buenos ejemplares presentan una fuerte expresión melánica en la cabeza.

CRITERIOS:

Puntos Teóricos: 30

Evaluación	Descripción	Puntos
EXCELENTE	 Dibujo y distribución melánica similares al clásico, con una tonalidad plomo fuertemente oxidada. Ausencia de feomelanina visible. Pico, patas y uñas fuertemente oxidadas. 	29
BUENO	 Dibujo y color general de tonalidad plomo. Ligera presencia de feomelanina. Pico, patas y uñas oxidadas. 	28-27
SUFICIENTE	 Dibujo interrumpido o fino con poca oxidación. Color general menos obscuro (menos "envoltura"). Presencia de feomelanina. Pico, patas y uñas poco oxidadas. 	26-24
INSUFICIENTE	 Dibujo confuso y/o muy fino de tonalidad tendiendo al ágata. Presencia evidente de feomelanina. Pico, patas y uñas claros. 	23-18





Bruno Mogno

El factor mogno en estos pájaros reduce la feomelanina y realiza la inversión de la eumelanina bruna. Esta inversión ocasiona que la eumelanina se deposite en la parte inferior del canal medular de las remeras y timoneras.

Los pájaros toman una tonalidad bruno-gris. Aunque el gris sea una tonalidad del negro, el bruno-gris es el aspecto observado en los brunos mogno y es debido principalmente a la inversión de la eumelanina bruna. Sin embargo es condición indispensable, en los brunos mogno, que sus melaninas presenten el aspecto bruno-gris.

No son aceptables tonalidades bruno claro, similar a la del bruno eumo, o bruno rojizo similar al satiné, porque ellas no se adaptan a las características de la actuación del factor mogno.

El color general de los pájaros ("envoltura") determinado por la acción de las melaninas, es de tonalidad bruno-gris

Remeras y timoneras tienen el mismo color de dibujo

Pico, patas y uñas son de color brunáceo.

CRITERIOS:

Puntos Teóricos: 30

Evaluación	Descripción	Puntos
EXCELENTE	 Dibujo similar al clásico, pero de color bruno-gris fuertemente oxidado. Color general ("envoltura") bruno gris fuertemente oxidado. Remeras y timoneras de la misma coloración del dibujo. Cabeza de color obscuro con dibujo evidente. Pico, patas y uñas brunaceas. 	29
BUENO	 Dibujo similar al clásico, pero de color bruno-gris oxidado. Color general ("envoltura") bruno-gris oxidado. Remeras y timoneras de la misma coloración del dibujo. Cabeza menos obscura con dibujo menos evidente. Pico, patas y uñas brunaceas. 	28-27
SUFICIENTE	 Dibujo poco evidente. Tonalidad bruna suficiente para el reconocimiento del tipo o tendencia al rojizo aproximándose a la tonalidad del satiné. Color general ("envoltura") inferior a bueno. Cabeza con poco o sin dibujo. Pico, patas y uñas brunaceas. 	26-24
INSUFICIENTE	 Dibujo débil o ausente, efecto bruno-gris ausente. Tonalidad bruno incorrecta. Color general claro, tendencia al isabela clásico. Pico, patas y uñas brunaceas. 	23-18





